Чеченский государственный университет

Тема

«ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИНВАЗИРОВАННОСТИ ОВЕЦ И КОЗ ЛЕГОЧНЫМИ ГЕЛЬМИНТАМИ PROTOSTRONGYLUS SPP. В РАВНИННОМ ПОЯСЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ »

(Данные копроларвоскопии)

Возраст овец	Исследов. всего проб	Из них заражены протостр-ми	ЭИ, в %	ИИ в экз., среднем
Ягнята до 1 года	**455**	**96**	**21,1**	**136,4±1,7**
Молодняк от 1 года до 2 лет	1365	504	36,9	384,9±0,8
Овцы старше 2 лет	**1460**	**483**	**33,1**	**322,5±2,2**
Всего:	3280	1083	33,0	281,3±1,6

Результаты копрологического исследования показали, что у молодняка до года ЭИ ниже по сравнению с молодняком от 1 года до 2 лет на 15,8 %, старше 2 лет на 12,0 %. По ИИ на 248,5 экз. и 186,1 экз. соответственно.

(Данные вскрытия)

Возраст овец	Исследов. всего голов	Из них заражено гельминтами	ЭИ, в %	ИИ в экз., среднем
Ягнята до 1 года	41	11	26,8	166,4±7,3
Молодняк от 1 года до 2 лет	**130**	**63**	**48,5**	**409,8±6,5**
Овцы старше 2 лет	149	64	43,0	340,5±8,4
Всего:	**320**	**138**	**43,1**	**305,6±7,4**

По результатам вскрытия у молодняка до года ЭИ оказалось ниже по сравнению с молодняком от 1 года до 2 лет на 21,7 %, старше 2 лет на 16,2 %. По ИИ на 243,4 экз. и 139,2 экз. соответственно.

Тема

«ИНВАЗИРОВАННОСТЬ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ НА ПАСТБИШНЫХ БИОТОПАХ РАВНИННОГО ПОЯСА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Инвазированность наземных моллюсков паразитозами в т. ч. личинками легочных нематод на пастбищах равнинного пояса

№ п/п	Наименование биотопов на пастбище	Результаты зараженности моллюсков (n=10502) (средние показатели)			
		Иссл. мол-ов. (экз.)	К-во зар-х мол-в в т. ч. лич. прот-ил	ЭИ (%)	ИИ (экз.)
1	**Степь**	**1200**	**338/160**	**28,2/13,3**	**12/2**
2	Равнинные луга	1300	400/180	30,8/13,8	13/3
3	**Кустарники**	**1200**	**520/220**	**43,3/18,3**	**9/3**
4	Балки	672	270/108	40,1/16,1	6/2
5	**Опушки леса**	**900**	**300/120**	**33,3/13,3**	**8/1**
6	Лесополосы	950	350/170	36,8/17,9	11/2
7	**Сельские пастбища**	**2100**	**850/440**	**40,5/21,0**	**24/9**
8	Участки вокруг водоемов	1180	535/192	45,3/16,3	18/5
9	**Лесные массивы**	**1000**	**350/130**	**35,0/13,0**	**7/1**
Исследовано всего		10502	3913/1720	37,3/16,4	12/3

Высокий процент ЭИ выявлено в участках вокруг водоемов, кустарников и присельских пастбищ – 40,5-45,3 % и личинками протостронгил 16,3-21,0 %, при ИИ – 9-24 и 3-9 экз. соответственно. Низкая зараженность в степной зоне по всем видам гельминтозов – 28,2 % и личинками протостронгил 13,3% при ИИ 12,0 экз. (нематод, трематод, цестод, личинками мух) и 2,0 экз. личинки легочных нематод

Спасибо за внимание